

## A réti cankó (*Tringa glareola*) vonulása Magyarországon

Pellinger Attila és Ferenczi Márta

Pellinger, A. and Ferenczi, M. 2008. The migration of Wood Sandpiper (*Tringa glareola*) in Hungary. - Ornis Hung. 15-16: 117-117.

A gyűrűzött réti cankók megkerülései (14) arra utalnak, hogy más, északi elterjedési területű partmadarakhoz hasonlóan a balti és fennoszkandináv régióban fészkelők Észak-Lengyelország irányából közelítik meg a kárpát-medencei vonulólhelyeket, és innen az Adria felé indulnak tovább. A néhány (4) nyugat-afrikai telelőhelyről származó megkerülés mellett csekély számú (3) visszafogással rendelkezünk a közbeeső területekről, így a nálunk megjelenő réti cankók vonulási útvonaláról csak a fajra vonatkozó szakirodalmi forrásokkal való összevetés révén következtethetünk. A réti cankók a Földközi-tenger északi és déli partvonalát követve is eljuthatnak a telelőterületre, esetleg azt az Appenin-félszigeten keresztül átszelve a Szaharát átrepülve is eljuthatnak oda. Az átvonulás Magyarországon április első felében kezdődik meg, erőssége május közepén a legnagyobb. Őszi vonulása rendszerint erősebb, csúcspontja július végére esik. Az utolsó példányok rendszerint október közepén hagyják el a Kárpát-medencét. A Mekszikópusztán augusztustól októberig tartó partimadár gyűrűzése során szinte kizárólag fiatal példányokat fogunk be, ami arra utal, hogy ekkorra az adult példányok már tovább vonultak.

Pellinger A., Fertő-Hanság Nemzeti Park, e-mail: [pellinger@fhnp.kvvm.hu](mailto:pellinger@fhnp.kvvm.hu) Ferenczi M., Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, e-mail: [ferenczim@freemail.hu](mailto:ferenczim@freemail.hu)

